# Drax®

# ANT KIL PF

**Pour le contrôle des fourmis à protéine et graisse.**

**GARANTIE:**

Acide Borique .....5,0%

Avertissement, contient les allergènes arachides et soya.

## COMMERCIAL

**POUR USAGE DANS Les Foyers, les Maisons de Retraite, les Hôpitaux, les Épiceries, les Restaurants, les Hôtels, les Motels, les Apartments, les Zoos, les Bateaux, les Chenils, les Autorails et Wagons, les Maisons Mobiles, les Écoles et les Structures Commerciales**

## No. D'ENREGISTREMENT 26399
## LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

## GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

CB **Bait**

FMC

**FMC Corporation**
**1735 Market Street**
**Philadelphia PA**
**19103**
**USA**

**CONTENU NET 15g**

## PRÉCAUTIONS:

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Nocif si avalé. Bien se laver les mains après la manipulation. Peut causer une irritation oculaire. Éviter tout contact oculaire. Ne pas utiliser dans les zones de produits comestibles des établissements de manipulation des aliments, les restaurants ou les autres lieux où des aliments sont exposés. Éviter toute contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

**PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou lemédecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

TEmporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** Traiter selon les symptômes.

## MODO D'EMPLOI

**À l'intérieur:** Appliquer le gel à l'intérieur dans les lieux où il y a des fourmis, soit derrière le réfrigérateur et la cuisinière, autour de conduite d'eau, dans les fentes et les fissures autour des câdres de fenêtres, sur les plinths et sur les étagères. Renouveler au besoin.

**À l'extérieur:** Poser de petits appâts de la taille d'un pois sur les trottoirs, directement sur les fourmilières, dans les fentes et les fissures sur les rebords de fenêtres et sur les seuils si des fourmis entrent dans le bâtement. Renouveler au besoin.

Appliquer seulement dans des zones inaccessible aux enfants et aux animaux familiers. DRAX Ant Kil PF est un gel durable conçu en vue de reprimer toutes les fourmis à sucre, y compris les fourmis pharaon.

**ENTREPOSAGE:** Ranger dans le contenant initial loin des aliments et des produits alimentaires. Garder le produit dans une zone de rangement verouillée. Entreposer dans un endroit frais.

**ÉLIMINATION:** Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.